

Objawy u zakażonych zwierząt to m.in.:

- obfite ślinienie i mlaskanie,
- pęcherze i nadżerki w jamie ustnej oraz na kończynach,
- gorączka, brak apetytu, kulawizna, spadek mleczności,
- u młodych zwierząt śmierć może nastąpić bez wcześniejszych objawów.

Jak dochodzi do zakażenia?

Wirus przenosi się przez:

- bezpośredni kontakt między zwierzętami,
- skażoną paszę, ściółkę, sprzęt, pojazdy i odzież,
- produkty pochodzenia zwierzęcego (mleko, mięso),
- drogą kropelkową (aerozol z wirusem).

Jak zapobiegać pryszczycy?

- Unikaj kontaktu zwierząt z różnych stad,
- Nie używaj wspólnych narzędzi, pojazdów i sprzętu,
- Nie odwiedzaj innych gospodarstw,
- Izoluj każde nowo zakupione zwierzę przez 14 dni,
- Używaj odzieży i obuwia ochronnego,
- Dezynfekuj obuwie przed wejściem do budynków inwentarskich.

Szczepienia przeciwko pryszczycy są dostępne i mogą być stosowane wyłącznie zgodnie z zaleceniami **służb weterynaryjnych**.

Co robić w przypadku podejrzenia choroby?

Bezzwłocznie zgłoś każdy przypadek **Inspekcji Weterynaryjnej!**

Zgłoszenie jest **obowiązkowe** i kluczowe dla ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby.

Pamiętaj: Wczesne działanie to najlepsza ochrona Twojego stada i gospodarstwa!